

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

10M - 10 mars 1992

## GRANDES CULTURES SEMENCES - COLZA N° 2

(en collaboration avec les SUAD du Gard et de l'Hérault et les Coopératives SUD-CEREALES et de BARJAC)

### MELIGEHTES :

- captures importantes localement
- cultures au stade D1, très sensibles

### CHARANCON DE LA TIGE :

- sorties très échelonnées et faibles
- attention jusqu'au stade tige 20 cm

### STADES :

- \* zones précoces littorales : D1 à E
- \* zones tardives nord-gardoise : C1 à D1



Stade D1  
boutons accolés



Stade E  
boutons écartés

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076/MONTPELLIER CEDEX / Tél : 67 02 41 42

////////////////////

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD

© Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

Nouvelle adresse :

ZAC D'ALCO - BP 3056

34034 MONTPELLIER CEDEX 01

Tél : 67.10.19.50



P 12

## CAPTURES

- depuis début mars les captures se sont quasiment généralisées sur l'ensemble des secteurs des départements de l'Hérault et du Gard.
- les niveaux enregistrés, tant en méligèthes qu'en charançons de la tige, sont généralement faibles, sauf localement (Maurin, St Clément la Rivière, Quissac), mais il n'existe pas de seuils à partir du piégeage, le rendement du piège pouvant être très variable et très mauvais (Conqueyrac).



Meligèthe  
longueur : 2-3 mm



Charançon de la tige  
longueur : 3-4 mm, pattes entièrement noires

## STRATEGIE

### 1/ MELIGETHES

- \* **VISITEZ** vos cultures en réalisant des comptages sur 30 à 50 plants
- \* **TRAITEZ** dès que vous comptez :
  - 1 insecte par inflorescence jusqu'au stade boutons accolés
  - 2-3 insectes par inflorescence jusqu'au stade premières fleurs ouvertes

### 2/ CHARANCON DE LA TIGE

Un traitement a dû être réalisé en zones sensibles et/ou sur cultures de semences

Celui-ci peut encore être réalisé dans les zones les plus tardives, toute intervention spécifique sur ce ravageur devenant inutile passé le stade tige 20 cm.

## PRODUITS DE TRAITEMENT

Voir le tableau de l'avis précédent, en retenant encore de préférence un produit bien actif sur ces deux ravageurs.